OSCILAÇÕES AMORTECIDAS

76 • Um corpo de 2,00 kg oscila preso a uma mola, com uma amplitude inicial de 3,00 cm. A constante de força da mola é 400 N/m. Determine (a) o período e (b) a energia total inicial. (c) Se a energia diminui 1 por cento a cada período, determine a constante de amortecimento linear b e o fator Q .

77 •• Mostre que a razão entre as amplitudes de duas oscilações sucessivas é constante para um oscilador linearmente amortecido.

78 •• Um oscilador tem um período de 3,00 s. Sua amplitude diminui 5,00 por cento em cada ciclo. (a) De quanto diminui sua energia mecânica em cada ciclo? (b) Qual é a constante de tempo τ ? (c) Qual é o fator Q ?

79 •• Um oscilador linearmente amortecido possui um fator Q igual a 20. (a) Qual é a fração de redução da energia, em cada ciclo? (b) Use a Equação 14-40 para determinar a diferença percentual entre ω' e ω_0 . Dica: Use a aproximação $(1+x)^{1/2} \approx 1 + \frac{1}{2}x$, para x pequeno.

80 •• Um sistema massa-mola linearmente amortecido oscila a 200 Hz. A constante de tempo do sistema é 2,0 s. Em $t = 0$, a amplitude de oscilação é 6,0 cm e a energia do sistema oscilante é 60 J. (a) Quais são as amplitudes de oscilação em $t = 2,0$ s e em $t = 4,0$ s? (b) Quanta energia é dissipada no primeiro intervalo de 2 segundos e no segundo intervalo de 2 segundos?

81 •• **APLICAÇÃO EM ENGENHARIA** Sismólogos e geólogos constataram que a Terra vibra com um período de ressonância de 54 min e um fator Q de cerca de 400. Após um grande terremoto, a Terra continua vibrando por até 2 meses. (a) Determine a porcentagem de energia de vibração perdida em cada ciclo, devido às forças de amortecimento. (b) Mostre que, após n períodos, a energia de vibração é dada por $E_n = (0,984)^n E_0$, onde E_0 é a energia original. (c) Se a energia de vibração original de um terremoto é E_0 , quanto vale a energia após 2,0 dias?

82 ••• Um pêndulo, em seu laboratório de física, tem um comprimento de 75 cm e uma bolinha de 15 g de massa. Para iniciar o balanço da bolinha, você coloca um ventilador próximo à ela, soprando uma corrente horizontal de ar. Enquanto o ventilador está ligado, a bolinha fica em equilíbrio com o pêndulo deslocado de um ângulo de $5,0^\circ$ com a vertical. O vento é soprado pelo ventilador a 7,0 m/s. Você desliga o ventilador e deixa que o pêndulo oscile. (a) Supondo que a força de arraste do ar seja da forma $-bv$, determine a constante de tempo de decaimento τ deste pêndulo. (b) Quanto tempo levará para a amplitude do pêndulo chegar a $1,0^\circ$?

83 ••• **APLICAÇÃO EM ENGENHARIA, RICO EM CONTEXTO** Você deve monitorar a viscosidade de óleos, em uma indústria, e determina a viscosidade de um óleo usando o seguinte método: A viscosidade de um fluido pode ser medida determinando-se o tempo de decaimento das oscilações para um oscilador de propriedades conhecidas e que esteja operando mergulhado no fluido. Desde que a rapidez do oscilador dentro do fluido seja relativamente pequena, de forma a evitar turbulência, a força de arraste do fluido sobre uma esfera é proporcional à rapidez v da esfera, em relação ao fluido: $F_r = 6\pi a\eta v$, onde η é a viscosidade do fluido e a é o raio da esfera. Assim, a constante b é dada por $6\pi a\eta$. Suponha que seu aparato consista em uma mola rija de constante de força igual a 350 N/cm e de uma esfera de ouro (6,00 cm de raio) pendurada na mola. (a) Qual é a viscosidade que você mede, para o óleo, se o tempo de decaimento para este sistema é 2,80 s? (b) Qual é o fator Q do sistema?

OSCILAÇÕES FORÇADAS E RESSONÂNCIA

84 • Um oscilador linearmente amortecido perde 2,00 por cento de sua energia em cada ciclo. (a) Qual é o seu fator Q ? (b) Se sua

frequência de ressonância é 300 Hz, qual é a largura da curva de ressonância $\Delta\omega$ quando o oscilador é excitado?

85 • Determine a frequência de ressonância para cada um dos três sistemas mostrados na Figura 14-33.

FIGURA 14-33 Problema 85

86 •• Um oscilador amortecido perde 3,50 por cento de sua energia a cada ciclo. (a) Quantos ciclos decorrem, até que metade de sua energia seja dissipada? (b) Qual é o seu fator Q ? (c) Se a frequência natural é 100 Hz, qual é a largura da curva de ressonância quando o oscilador é excitado por uma força senoidal?

87 •• Um corpo de 2,00 kg oscila preso a uma mola que tem uma constante de força igual a 400 N/m. A constante de amortecimento linear vale $b = 2,00$ kg/s. O sistema é excitado por uma força senoidal de valor máximo igual a 10,0 N e frequência angular $\omega = 10,0$ rad/s. (a) Qual é a amplitude das oscilações? (b) Se a frequência de excitação varia, em que frequência ocorrerá ressonância? (c) Qual é a amplitude de oscilação na ressonância? (d) Qual é a largura da curva de ressonância $\Delta\omega$?

88 •• **APLICAÇÃO EM ENGENHARIA, RICO EM CONTEXTO** Suponha que você tenha o mesmo aparato descrito no Problema 83, com a mesma esfera de ouro, agora pendurada em uma mola menos rija, com uma constante de força de apenas 35,0 N/cm. Você estudou a viscosidade do etileno glicol com este equipamento e encontrou uma viscosidade de 19,9 mPa $\cdot$ s. Agora, você decide excitar este sistema com uma força externa oscilante. (a) Se a magnitude da força de excitação sobre o equipamento é de 0,110 N, e o equipamento é excitado em ressonância, qual será a amplitude da oscilação resultante? (b) Se o sistema não fosse excitado, mas largado oscilando, que porcentagem de sua energia seria perdida em cada ciclo?

PROBLEMAS GERAIS

89 • **VÁRIOS PASSOS** O deslocamento de uma partícula a partir do equilíbrio é dado por $x(t) = 0,40 \cos(3,0t + \pi/4)$, com x em metros e t em segundos. (a) Determine a frequência f e o período T deste movimento. (b) Encontre uma expressão para a velocidade da partícula como função do tempo. (c) Qual é a sua rapidez máxima?

90 • **APLICAÇÃO EM ENGENHARIA** Um astronauta chega a um novo planeta e utiliza um instrumento simples para determinar a aceleração da gravidade local. Antes de chegar, ele tinha registrado que o raio do planeta era de 7550 km. Se o seu pêndulo simples de 0,500 m de comprimento tem um período de 1,0 s, qual é a massa do planeta?

91 •• Um relógio de pêndulo marca a hora certa na superfície da Terra. Em qual caso o erro será maior: se o relógio for levado para uma mina de profundidade h , ou se ele for levantado até uma altura h ? Prove sua resposta e suponha $h \ll R_T$.

92 •• A Figura 14-34 mostra um pêndulo de comprimento L com uma bolinha de massa M . A bolinha é presa a uma mola de constante de força k , como mostrado. Quando a bolinha está diretamente abaixo do suporte do pêndulo, a mola está frouxa. (a) Deduza uma expressão para o período de oscilação do sistema para pequenas amplitudes de vibração. (b) Suponha $M = 1,00$ kg e L tal que, na ausência da mola, o período é 2,00 s. Qual é a constante de força k , se o período de oscilação do sistema é 1,00 s?

FIGURA 14-34 Problema 92

93 •• Um bloco, de massa m_1 , está apoiado sobre uma superfície horizontal sem atrito. O bloco, que está preso a uma extremidade de uma mola horizontal de constante de força k , oscila com uma amplitude A . Quando a mola está distendida ao máximo e o bloco está instantaneamente em repouso, um segundo bloco, de massa m_2 , é colocado sobre o primeiro. (a) Qual é o menor valor do coeficiente de atrito estático μ_e para o qual o segundo bloco não escorrega sobre o primeiro? (b) Explique como a energia mecânica total E , a amplitude A , a frequência angular ω e o período T do sistema são afetados pela colocação de m_2 sobre m_1 , supondo que o coeficiente de atrito seja grande o suficiente para evitar escorregamento.

94 •• Uma caixa de 100 kg está pendurada do teto de uma sala — suspensa por uma mola com uma constante de força de 500 N/m. O comprimento da mola frouxa é 0,500 m. (a) Determine a posição de equilíbrio da caixa. (b) Uma mola idêntica é esticada e presa ao teto e à caixa, paralelamente à primeira mola. Determine a frequência das oscilações quando a caixa é liberada. (c) Qual é a nova posição de equilíbrio da caixa quando atinge o repouso?

95 •• **APLICAÇÃO EM ENGENHARIA** A aceleração da gravidade g varia com a localização geográfica devido à rotação da Terra e porque a Terra não é perfeitamente esférica. Isto foi constatado pela primeira vez no século XVII, quando se observou que um relógio de pêndulo cuidadosamente regulado para dar a hora certa em Paris se atrasava cerca de 90 s por dia próximo ao equador. (a) Mostre, usando a aproximação diferencial, que uma pequena variação da aceleração da gravidade Δg produz uma pequena variação no período ΔT de um pêndulo, dada por $\Delta T/T \approx -\frac{1}{2} \Delta g/g$. (b) Que variação de g é necessária para provocar uma variação no período de 90 s por dia?

96 •• Um pequeno bloco de massa igual a m_1 está sobre um pistão que vibra, verticalmente, em movimento harmônico simples descrito pela fórmula $y = A \sin \omega t$. (a) Mostre que o bloco abandonará o pistão se $\omega^2 A > g$. (b) Se $\omega^2 A = 3g$ e $A = 15$ cm, em que momento o bloco abandonará o pistão?

97 •• Mostre que, nas situações mostradas na Figura 14-35a e 14-35b, o corpo oscila com uma frequência $f = (1/2\pi)\sqrt{k_{ef}/m}$, onde k_{ef} é dado por (a) $k_{ef} = k_1 + k_2$ e (b) $1/k_{ef} = 1/k_1 + 1/k_2$. Dica: Determine a magnitude da força resultante F sobre o corpo para um pequeno deslocamento x e escreva $F = -k_{ef}x$. Note que na Parte (b) as molas são distendidas de quantidades diferentes, cuja soma é x .

98 •• **RICO EM CONTEXTO** Durante um terremoto, um piso horizontal oscila horizontalmente em um movimento harmônico simples aproximado. Suponha que ele oscile em uma única frequência, com

FIGURA 14-35 Problema 97

0,80 s de período. (a) Após o terremoto, você examina o vídeo do piso em movimento e verifica que uma caixa sobre o piso começou a escorregar quando a amplitude atingiu 10 cm. De posse destes dados, determine o coeficiente de atrito estático entre a caixa e o piso. (b) Se o coeficiente de atrito entre a caixa e o piso for 0,40, qual será a amplitude máxima de vibração antes da caixa escorregar?

99 •• Se prendermos dois blocos, de massas m_1 e m_2 , a cada uma das extremidades de uma mola de constante de força k , e os fizermos oscilar largando-os do repouso após distender a mola, mostre que a frequência de oscilação é dada por $\omega = (k/\mu)^{1/2}$, onde $\mu = m_1 m_2 / (m_1 + m_2)$ é a massa reduzida do sistema.

100 •• Você verifica, no laboratório de química, que um dos modos de vibração da molécula de HCl tem uma frequência de $8,969 \times 10^{13}$ Hz. Usando o resultado do Problema 99, determine a “constante de mola efetiva” entre os átomos de H e de Cl na molécula de HCl.

101 •• Se um átomo de hidrogênio no HCl fosse substituído por um átomo de deutério (formando o DCl), no Problema 100, qual seria a nova frequência de vibração da molécula? O deutério consiste em 1 próton e 1 nêutron.

102 ••• **PLANILHA ELETRÔNICA** Um bloco, de massa m , em repouso sobre uma mesa horizontal, é preso a uma mola que tem uma constante de força k , como mostrado na Figura 14-36. O coeficiente de atrito cinético entre o bloco e a mesa é μ_c . A mola está frouxa se o bloco está na origem ($x = 0$) e o sentido $+x$ é para a direita. A mola é distendida de um comprimento A , com $kA > \mu_c mg$, e o bloco é liberado. (a) Aplique a segunda lei de Newton ao bloco para obter uma equação para sua aceleração d^2x/dt^2 durante o primeiro meio ciclo, quando o bloco se move para a esquerda. Mostre que esta equação pode ser escrita como $d^2x'/dt^2 = -\omega^2 x'$, onde $\omega = \sqrt{k/m}$ e $x' = x - x_0$, com $x_0 = \mu_c mg/k = \mu_c g/\omega^2$. (b) Repita a Parte (a) para o segundo meio ciclo, quando o bloco se move para a direita e mostre que $d^2x''/dt^2 = -\omega^2 x''$, onde $x'' = x + x_0$ e x_0 tem o mesmo valor. (c) Use uma planilha eletrônica para plotar os cinco primeiros meios ciclos, com $A = 10x_0$. Descreva o movimento, se existente, após o quinto meio ciclo.

FIGURA 14-36 Problema 102

103 ••• A Figura 14-37 mostra um meio cilindro maciço e homogêneo, de massa M e raio R , em repouso sobre uma superfície horizontal. Se um dos lados deste sólido for ligeiramente empurrado para baixo e largado, ele oscilará em torno de sua posição de equilíbrio. Determine o período desta oscilação.

FIGURA 14-37 Problema 103